

8월의 영농정보

☐ 노지감귤

○ 병해충 방제

- 검은점무늬병: 죽은 가지 제거 및 방제약제 살포(만수무강, 비온엠 등)
- 깍지벌레: 예찰 후 유충 발생 시 방제(바람탄, 히어로, 팡파레에스 등)
- 총채벌레: 발생 초기 방제(크레모아, 골드윈 등)
- 굴굴나방: 여름순 방제(귀공자, 엑시렐, 슈퍼펀치 등)

※ 고온기 약해발생 주의: 이른 아침 농약살포, 3종 이상 혼용 금지

○ 열매숙기: 아랫부분 작은 열매, 상처난 열매, 병해충 피해 열매

※ 수세가 좋은 나무에서 비대가 정상적으로 잘 되면 10월 상순 이후 열매숙기

○ 일소과 방지: 수세유지(과다착과 금지, 엽수확보)

☐ 만감류

○ 병해충 방제: 검은점무늬병(만수무강, 프린트 등), 굴굴나방·진딧물(아나콘다, 칼립소 등), 굴녹응애·차면지응애(모스킬, 모벤토, 산마루 등) 등

○ 온도관리: 주·야간 자연온도 ※ 고온에 의한 과도한 증산작용은 수세 및 품질에 악영향 미침

○ 물관리: 3~5일 간격 12~20톤/10a(가급적 오전 일찍 관수)

○ 수용성 칼슘제 살포: 8월 중순부터 15~20일 간격 3~4회 살포(난용성 칼슘제는 살포 후 과피에 백색 얼룩이 남음)

☐ 키위

○ 여름순 제거 및 신초관리: 도장지 전정, 수관관리(결과지 등 충분히 햇빛 투과)

○ 온도·물관리: 천창·측창 최대개방, 3~5일 간격 12~25t/10a

○ 병해충 방제: 총채벌레(검객, 기사도, 렘페이지 등), 곰팡이류[점무늬병, 과실무름병 등(만수무강, 베노밀, 벨쿠트 등)] 등

☐ 콩

○ 병해충 방제: 콩나방(바이고, 유토피아 등), 불마름병(방범대, 명품탄 등), 노린재류(명타자, 똑소리 등) 등

○ 웃거름: 개화기, 생육이 부진할 경우 요소 8~9kg/10a

☐ 당근

○ 파종: 8월 중순까지, 파종량 1~1.5L/10a(기계 파종 기준), 흙덮기는 1cm 내외 정도로 얇게 함

○ 파종 후 관리: 파종 후 3일 이내 전용 제초제 살포하며 5~10일간 비 예보가 없을 시 관수 실시

○ 솟음작업: 생육이 지나치게 왕성하거나 저조한 것, 뿌리 윗부분이 많이 노출된 것, 병든개체 위주

☐ 가을감자

○ 밀거름 주기: 완숙퇴비 1,500~2,000kg, 요소 39kg, 용과린 125kg, 염화加里 32kg/10a

○ 파종: 8월 중순~9월 상순

- 파종 하루 전 또는 당일 20cm 이상 깊이 갈이 및 이랑 형성: 건조해 피해 경감

※ 가을재배는 싹이 트는 비율을 높이기 위해 얇게 심어 빨리 싹을 틔운 후 흙을 깊게 덮어 주는 것이 좋음

☐ 쪽파

○ 밀거름 주기: 완숙퇴비 2,000kg, 요소 45kg, 용성인비 50kg, 염화加里 25kg/10a

○ 파종: 8월 하순~9월 중순, 파종 전 토양살충제(다아라, 사령탄 등) 살포

☐ 공통사항

○ 재해대비: 집중호우 대비 배수로 정비, 태풍 대비 하우스 버팀줄 및 비닐고정 끈 보수, 천·측창 개폐시설 점검

※ 자세한 내용은 동부농업기술센터 특화작목육성팀(760-7621~3), 신기술보급팀(760-7641~3)으로 문의하여주시면 감사하겠습니다.